

AADAA

BARRERA

Aminoácidos

AADAA BARRERA é um produto fertilizante projetado como um suplemento nutricional. A sua utilização é especialmente indicada para abrandar os sintomas causadas por períodos de alto stress nas culturas, principalmente devido à presença de vírus (PepMV, ToCV e TSWV).

Fortalece as plantas em períodos de stress.

Mantem o equilíbrio nutricional e vital da planta.

Promove a atividade enzimática da planta.

Estimula a produção de auxinas naturais.

Aumenta a produtividade da cultura.

Melhora a qualidade da colheita.



Composição m/m

| | |
|---|------|
| Aminoácidos livres..... | 20% |
| Aminograma: Valina 10%; Tirosina 5%; Histidina 5% | |
| Aminoácidos obtidos por fermentação enzimática (<i>C.glutamicum</i>). | |
| Azoto Total..... | 2,8% |
| Azoto Orgânico..... | 2,4% |

Benefícios de **AADAA BARRERA**

- **Melhora a tolerância para PepMV, ToCV e TSWV**

Com o uso de **AADAA BARRERA**, os sintomas derivados aos vírus mencionados acima, são reduzidos consideravelmente, chegando mesmo ao ponto de não se manifestarem. O produto é capaz de encapsular o vírus durante um período de tempo, impedindo que se manifeste em plantas infetadas.

- **Recupera plantas infetadas por vírus**

Uma vez detetada a presença de vírus começa-se a usar **AADAA BARRERA**, observa-se que, passado cerca de uma semana após a aplicação do programa, o novo tecido vegetal mostra-se assintomático. Como nota de esclarecimento, os novos rebentos estão igualmente infetados, no

entanto, não são eles manifestam sintomas devido à ação do produto.

- **Fortalece plantas tratadas**

Plantas tratadas com **AADAA BARRERA**, mostram um estado de saúde fortalecido devido, entre outros, à alta percentagem de fitofortificantes que compõem o produto. Desta forma, é possível aumentar a saúde da planta e consequentemente a ação retrovírica do programa.

Compatibilidade

O **AADAA BARRERA** pode ser usado em todos os tipos de culturas. A sua aplicação pode ser feita tanto via rega como via foliar.

Dose: 0,5-1,0 kg /ha

(Dose indicativa, tanto na aplicação foliar como na raiz)

Inicie o programa assim que apareçam os primeiros sintomas, repetindo a aplicação com uma frequência de 7 a 15 dias, dependendo da gravidade da infeção.

O programa acaba por ser mais eficaz, uma vez sendo aplicado em prevenção (mesmo no viveiro ou no momento em que se recebe as plantas) ou quando são deteta a presença de insetos que transmitem a doença.

AADAA BARRERA é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos utilizados. No entanto, não é recomendado misturar com produtos contendo óleo, cobre, enxofre ou que tenham pHs diferentes.

As informações fornecidas são o resultado da realização de numerosos e detalhados estudos e ensaios. No entanto, na sua utilização podem intervir numerosos fatores que estão fora do nosso controle (preparação de misturas, aplicação, clima, etc.) O usuário será responsável pela ocorrência de danos decorrentes de uma interpretação incorreta das instruções indicadas no rótulo do produto.

Dados técnicos

| | |
|--------------------|----------------|
| Estado físico: | Sólido |
| Cor: | Creme |
| Odor: | Característico |
| Densidade: | N/A |
| pH (solução a 4%): | 4,2 ± 0,5 |
| Embalagem: | 0,5kg/saqueta |

Distribuído em Portugal por



Fabricado por



AADAA Suministros, S.L.

C/ Sierra de Loja, nº8, P.I. La Juaida – 04240 – Viator, Almería (España)

Tlf: +34 950 315 784

Email: aadaa@aadaa.es

www.aadaa.es

